CURA 50

Generalidades
Cura es un fungicida sistémico formulado como líquido suspensible (floable) de efecto preventivo y/o curativo, indicado para pulverización o baño de inmersión en cítricos y en otros cultivos frutihortícolas tanto en planta como en postcosecha, para el control de hongos durante el almacenamiento.
Preparación y Equipos de Aplicación
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 partes de su capacidad con agua, y poniendo en marcha los agitadores, agregar la cantidad del fungicida según dosis. Completar finalmente el volumen total de agua. Pulverizar siempre con los agitadores en funcionamiento. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo. Puede utilizarse cualquier tipo de máquina pulverizadora, manual o motorizada.
AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.
Recomendaciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis cc/100l. de agua	Recomendaciones
Manzano, Peral y Cítricos	Moho podredumbre de la fruta almacenada (Botrytis sp., Penicillum sp.; Phomopsis sp., Monilia sp.; Diplodia sp., Gloesporium sp.)	50-100	Realizar los tratamientos a los 20 días y a los 7 días antes de la cosecha. Con esto se previene la podredumbre de la fruta en su almacenamiento frigorífico. Especialmente indicado para la podredumbre del pedúnculo en algunas variedades de peras (por ej. D Anjóu).
Manzano y Peral	Sarna (Venturia pirina V. inaequalis)	30-50	La 1° aplicación, antes de abrirse las yemas. La 2°, antes de la floración. La 3°, a la caída de los pétalos. La 4°, 10 días después.
Duraznero	Sarna del duraznero (Cladosporium carpophilum)	60	Una aplicación después de formado el fruto. Repetir cada 10 a 20 días según condiciones climáticas favorables para el ataque.
	Podredumbre morena (Monilia cinerea)	50	
Cítricos	Sarna (Elcinoe faucetti)	100	Aplicar al aparecer los pimpollos (agosto - septiembre) y en plena floración (octubre - noviembre).
Cítricos	Melanosis (Phomopsis citri)	100	Comenzar las aplicaciones a principios de marzo, repetir en caso de lluvias.
	Mancha grasienta (Mycosphaerella citri)	75	Aplicar durante mayo - marzo.
	Enfermedad del cabito o Cabito seco	100	Aplicar en primavera en el momento de la floración. En climas cálidos y húmedos, repetir en verano.
Vid	Moho gris (Botrytis cinerea)	50-100	1° Tratamiento: antes del cierre de los racimos. 2° Tratamiento: al envero. Continuar según las condiciones climáticas favorables para el ataque.
Mani	Viruela Temprana (Cercospora arachidicola)	250 cc/ha	El caudal deberá ser de 200 – 300 l/ha de agua. Presión 100 – 150 lb/pulg² para una buena preparación del pulverizado. 1° aplicación: al observar los primeros síntomas (mancha). Repetir cada 15 – 20 días. En aplicaciones aéreas: 30 – 35 l/ha de agua.
Poroto	Sclerotina del poroto (Sclerotinia sclerotium)	50	Aplicar a los 30 días de la siembra. Repetir a los 15 días si es necesario.
	Antracnosis del poroto (Septoria apii graveolentis lindemuthianum) Mancha angular (Isariopsis Griseola)	250 cc/ha	Aplicar al momento de cierre del cultivo. El caudal deberá ser: en aplicación terrestre: 350-500 l/ha. En aplicación aérea: 35-50 l/ha.
Soja	Enfermedades de la semilla (Phomopsis sojae, Diaphorte sp., Colletotrichum sp.,Septoria sp.)	400 cc/ha + 2,5 kg./ha de mancozeb 80%	Realizar la 1° aplicación al formarse la chaucha y una 2° aplicación a los 20 días.

fitoquímica
CALIDAD PARA CRECER

CUIDADO

CURA 50

Cultivo	Enfermedad	Dosis cc/100l. de agua	Recomendaciones
Apio	Viruela (Septoria apii graveolentis)	50-70	Iniciar el tratamiento al observar los primeros síntomas, a intervalos de 10 a 15 días.
Lechuga	Podredumbre (Sclerotinia sclerotiorum), (Botrytis cinerea)	50-70	Iniciar los tratamientos después del enraizamiento, a intervalos de 10 a 15 días.
Melon y pepino	Oidio (Oidium sp.)	25-30	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad y repetir cada 21-28 días.
Tomate	Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)	50-60	Inciciar las aplicaciones al comenzar el ataque y repetir cada 15 días.
Zapallito de tronco	Oidio del zapallito (Erysiphe cichoracearum)	50	Aplicar al observar los primeros signos y repetir a los 20-25 días.
Frutilla	Podredumbre gris (Botrytis cinerea)	50-70	Realizar 3 tratamientos: 1° con el 50% de las flores abiertas. El 2° a la caída de los pétalos, y el 3° al comenzar la madurez de la frutilla.
Clavel	Fusiarosis (fusarium oxisporum)	50-100	Aplicar al notarse los síntomas de la enfermedad, repetir cada 10-15 días.
	Podredumbre de los pimpollos (Botrytis cinerea)	50-100	Aplicar desde la aparición del botón floral cada 10-15 días.
Rosa	Podredumbre (Botrytis cinerea), Oidio (Oldium sp.)	25-30	Aplicar al notarse los síntomas de la enfermedad, repetir cada 15 días.
Invernáculos de flores	Podredumbre (Botrytis cinerea)	25-30	Aplicar cada 15 días a partir de los primeros síntomas de la enfermedad.
Banano	Sigatoca (Mycosphaerella musicola)	250 cc/ha + 7 a 8l/ha de aceite emulsionable fungicida en 25 l/ha de agua, en aplicaciones aéreas. En aplicaciones terrestres graduar el caudal según el equipo pulverizador. Pulverizar antes que aparezca la enfermedad, cuando las condiciones de temperatura y humedad son favorables. Repetir a los 15 días.	

Tratamiento de post-cosecha

Cultivo	Enfermedad	Dosis cc/100l. de agua	Recomendaciones
Manzanas, peras y cítricos	Moho y prodedumbre de las frutas cosechadas para consumo o almacenamiento en frío (Botrytis sp.; Diplodia sp.; Monilia sp.; Penicillium sp.; Gloeosporium sp.)	50-100	La inmersión o pulverización de la fruta debe efectuarse luego de la cosecha y durante 1 o 2 minutos, manteniendo el caldo fungicida en agitación continua. La mezcla debe cambiarse todos los días.
Gladiolos, tulipanes y fresias	(Penicillium sp.;Fusarium sp.; Botrytis sp.; Rhizoctonia sp.)	200	Sumergir los bulbos durante 10 a 15 minutos poco antes de la siembra.

Compatibilidad
Puede mezclarse con otros fungicidas exceptuando los alcalinos.
Los insecticidas y acaricidas deben agregarse al caldo fungicida poco antes de la pulverización. También puede emplearse en mezclas con fertilizantes foliares.
Fitoxicidad
Cura no es fitotóxico siguiendo fielmente las indicaciones de uso.

La empresa solo se hace responsable de las características fisicoquímicas de este producto al no participar de la aplicación no se hace responsable de los daños y perjuicios que deriven de un uso inadecuado del mismo. CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

fitoquímica
CALIDAD PARA CRECER

CUIDADO

CURA 50

Precauciones generales
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
DESTRUYA LOS ENVASES VACÍOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
Evite su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar durante la preparación y aplicación: guantes y botas de goma, careta y antiparras.
No beber, comer o fumar durante los tratamientos.
Finalizados los mismos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Riesgos ambientales
Aves: Prácticamente no tóxico.
Peces: Muy tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de por lo menos un metro entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución por la posibilidad del mal uso o errores en las dosis de aplicación. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar sobre caminos de tierra y campos arados.
Abejas: Virtualmente no tóxico.
Tratamiento de remanentes y espacios vacíos: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en un envase herméticamente cerrado, y almacenado en un depósito, en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos.
Almacenamiento
Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos, forrajes y casa habitada.
Derrames
Cubrir con tierra, aserrín o arena. Barrer y recoger en un contenedor para su envío a una planta de tratamiento.
Métodos de destrucción de envases
Practicar el triple lavado. Colocar en tambores y enviar a una planta de tratamiento para su destrucción. No quemar a cielo abierto.
Primeros auxilios
En caso de ingestación accidental, provocar el vómito con agua tibia si el accidentado está consciente. Seguir con tratamiento sintomático. En caso de inhalación, poner al paciente al aire libre. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua limpia, jabón y esponja suave. Por salpicaduras en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua limpia manteniendo los párpados abiertos. En todos los casos LLAMAR AL MÉDICO.

Advertencia para el médico
PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. CLASE IV.
Mínimo irritante ocular. Aplicar tratamiento sintomático.

Consultas en casos de intoxicación
- Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Prof. A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777.

fitoquímica
CALIDAD PARA CRECER

CUIDADO

CURA 50

FUNGICIDA

AGITESE ANTES DE USAR

SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Composición:
Carbendazim: (2-metoxicarbamoil-bencimidazol) .....50 g
Humectantes, dispersantes e inertes: .....csp100 cm^3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA Nro.: 36.163

FECHA DE VENCIMIENTO
LOTE NRO
No inflamable
Origen: Industria Argentina

fitoquímica
CALIDAD PARA CRECER

Est. Elaborador: Fitoquimica S.A.
RUTA 32 KM 4,2 I 2700 I PERGAMINO I BA
TEL: / FAX: 02477 421496
email I info@fitoquimica.com.ar
www.fitoquimica.com.ar

Cont. Neto
20Lts

CUIDADO