

PRECAUCIONES GENERALES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar careta, antiparras, guantes y ropa protectora adecuada durante la aplicación. Después del trabajo lavarse con agua y jabón todas las partes expuestas al contacto con el producto. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación.

RIESGOS AMBIENTALES:

Aves: Prácticamente No Tóxico.

Peces: Moderadamente Tóxico.

Abejas: Virtualmente Tóxico. No se espera exposición.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben juntarse para su destrucción.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. Los envases vacíos se almacenarán transitoriamente en las bolsas contenedoras correspondientes hasta que sean llevados al centro de acopio más cercano para su correcta eliminación.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original bien cerrado y lejos del hogar. El local debe ser fresco, seco y ventilado.

DERRAMES: Barrer el producto derramado y envasar en tambores hasta que sean llevados al centro de acopio más cercano para su correcta eliminación. No usar agua.

FUNGICIDA TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Curasemilla Doble



SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Composición

carbendazim: 2-metoxi-corbamoil-bencimidazol	10 g
tiram: bisulfuro de tetrametilcarbamilo	10 g
Inertes y colorante c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscripto en Senasa con el N° 34209

FECHA DE VENCIMIENTO
LOTE NRO

Inflamable de 3ra. Categoría
Industria Argentina



fitoquímica

Ruta 32 Km 4,2 - Pergamino (2700) B.A.

Te: 02477-421496 / 430934

E-MAIL: info@fitoquimica.com.ar

www.fitoquimica.com.ar

Cont. Neto

5 Lts

AGITASE ANTES DE USAR



CUIDADO



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión inducir al vómito, dando de beber agua tibia salada o solución de mostaza, repitiendo hasta que el líquido expulsado sea claro. Por salpicaduras en piel u ojos, enjuagar con abundante agua tibia. Llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Productos que normalmente no ofrecen peligro (CLASE IV).

Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Irritación de las mucosas y la piel. Dermatitis. Trastornos nerviosos centrales, con disminución de la temperatura corporal y de la presión sanguínea. Estado de excitación y síntomas de parálisis ascendente.

CONSULTAS POR INTOXICACIONES:**Capital Federal:**

Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212,

Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín,

Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806.

BUENOS AIRES: Haedo

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas

Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03).

CORDOBA:

Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303.

ROSARIO:

Hospital de Niños de Rosario

Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612.

T.A.S. CASAFA ((0341) 448-0077 ó 424-2727.

MENDOZA:

Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

INSTRUCCIONES DE USO:

Tratamiento en seco: Se coloca la semilla a tratar en un tambor rotativo hasta la mitad de su capacidad, se agrega la dosis indicada de **CURASEMILLAS DOBLE** y se mezcla durante 3 minutos. La semilla a tratar debe estar bien seca y puede ser "curada" en cualquier momento previo a la siembra.

Tratamiento semihúmedo: Se coloca la semilla a tratar en un tambor rotativo hasta la mitad de su capacidad, se agrega la dosis indicada de **CURASEMILLAS DOBLE** previamente mezclada con agua en partes iguales de manera de lograr una pasta de fácil distribución. Mezclar durante 3 minutos.

Tratamiento Húmedo: Se prepara una suspensión de **CURASEMILLAS DOBLE** en agua y se aplica sobre la semilla en movimiento, utilizando máquinas dosificadoras de curasemillas, por ejemplo de cucharitas.

Tratamiento de papa para "semilla": Colocar la suspensión a preparar en un piletón o tanque y sumergir los cortes durante 5 minutos. La reposición del líquido gastado hacerla con una suspensión un 10% más concentrada que la original. El baño no se usará más de 2 días, pues se degrada por suciedad de la papa. Con 1.000 litros de suspensión se pueden tratar 400 a 500 bolsas.

Restricciones de uso: La semilla tratada con **CURASEMILLAS DOBLE** será destinada únicamente para la siembra, no siendo apta para alimento o como forraje para los animales, como tampoco para la extracción de aceite. La venta de semilla "curada" para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, de granos destinados a consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas en granos para consumo, la ley determina el decomiso y fuertes multas. Piense que una sola bolsa de semillas tratadas, mezclada con varias toneladas de grano para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto serán severamente penados los infractores.

RECOMENDACIONES DE USO:

Tipo de semilla	Dosis c/100 kg de semilla	Enfermedades insectos que controla
SOJA, TRIGO, POROTO MANI DESCASCARADO, LENTEJA	300 cm ³	"DAMPING OFF" "COMPLEJO DE HONGOS DEL SUELO" (Fusarium spp. ; Rhizoctonia spp. ; Phytium spp. ; Mucor spp. ; Diplodia spp.
ARVEJA	625 cm ³	
ALFALFA LINO Y MELILOTUS	1000 cm ³	

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia"El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad: No es conveniente el uso en mezclas con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para las dosis recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

FITOQUIMICA S.A. no se responsabiliza por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar un uso distinto al indicado en este marbete.



CUIDADO

