MIDTEB DEFENDER

TERAPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS INSECTICIDA - FUNGICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN

midacloprid: 1-(6-cloro-3-piridini metil) -	Nnitroimidazo idir
2-ilideneamina	23.3 g
Tebuconazole: alfa-[2-(4-clorofenil) etil]-al	fa-(1,1- dimetiletil
1-H-1,2,4-triazol-1-etanolmina	
Inertes y colorante c.s.p	100 cm

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA Nº: 36.461

LOTE NRO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

INFLAMABLE DE 3° CATEGORÍA

INDUSTRIA ARGENTINA

Cont. Neto



Fitoquímica S.A. RUTA 32 KM 4,2 I 2700 I PERGAMINO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

www.fitoquimica.com.ar





















PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.

RIESGOS AMBIENTALES: MODERADAMENTE TÓXICO para AVES y PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO para PECES. No contaminar fuentes de agua. Por su forma de uso, no se esperan exposiciones a las abejas..

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben juntarse para su destrucción. TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. Los envases vacíos se almacenarán transitoriamente en las bolsas contenedoras correspondientes hasta que sean llevados al centro de acopio más cercano para su correcta eliminación.

más cercano para su correcta eliminación.

ALMACENAMIENTO: Se aconseja el almacenamiento en los envases originales bien cerrados en depósitos ventilados y cubiertos, sacos, frescos, al abrigo de la luz directa o de fuentes de calor, humedad etc. En lugares que mantengan la temperatura entre 0 y 30 grados centígrados, cerrados con candados y

fuera del alcance de los niños.

DERRAMES: Barrer el producto derramado y envasar en tambores hasta que sean llevados al centro de acopio más cercano para su correcta eliminación. No usar agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un medico o trasladar a la persona a un servicio de emergencias , llevando el envase o la etiqueta del producto. El producto puede causar irritación. Si hubiera contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un medico inmediatamente; con piel: quitar la ropa y los zapatos contaminados y lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental: inducir el vómito. La inducción del vomito debe estar supervisada por personal entrenado. Consultar al medico inmediatamente. Nunca administrar nada por la boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco y requerir asistencia medica. ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II).

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO MODERADAMENTÉ PELIGROSO (CLASE III).
Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.
Sintomas de intoxicación aguda: : Puede causar apatía, depresión del tono muscular, trastornos respiratorios, temblores y fuertes calambres en casos severos. La aparición de bradicardia y la hipotomía, pueden hacer necesaria la asistencia respiratoria y cardíaca.
CONSULTAS POR INTOXICACIONES: Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 ó 424-2727. MENDOZA: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

GENERALIDADES: MIDTEB DEFENDER es un insecticida y fungicida sistémico y de contacto para el tratamiento de semillas destinadas a la siembra. Protege a la semilla del ataque de hongos patógenos y de insectos, aumentando la energía y el poder germinativo y consecuentemente, el rendimiento del cultivo. MIDTEB DEFENDER permite un control integral de la semilla hasta la plántula. MIDTEB DEFENDER posee imidacloprid, derivado de las nitroguanidinas, que actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica, afectando el sistema nervioso de los insectos de suelo ocasionándoles la muerte, y tebuconazole, fungicida sistémico de efecto preventivo, curativo y erradicante que inhibe la biosíntesis del ergosterol de los hongos, impidiendo su multiplicación. MIDTEB DEFENDER no altera el poder germinativo de las semillas.

INSTRUCCIONES DE USO: Agitar bien antes de usar. En tambor giratorio: complete no más de 2/3 partes de la capacidad del tambor con semillas, agregue luego la dosis de MIDTEB DEFENDER mezclada con 1,3 a 1,8 L. de agua cada 100 kg. de semilla, hacer girar lentamente durante algunos minutos hasta que quede uniformemente coloreada. Proceda a sembrar. En el caso de utilizar máquinas curadoras, proceder de tal manera que las semillas queden uniformemente teñidas, utilizando la dosis proporcional de MIDTER DEFENDER a la cantidad de semilla proporcional de MIDTEB DEFENDER a la cantidad de semilla

RECOMENDACIONES DE USO:

Lutivo	Plaga	Dosis	Enfermedades
Trigo	Insectos de suelo: Gusanos blancos: Diloboderus abderus; Cyclocephala signaticolis; Colaspis spp.; Maecolaspis spp.; Pantomorus spp. Gusanos allambre: Discynetus gagates; Conoderus spp.; Agriotes spp. Pulgón ruso (Diuraphis noxious) Pulgón verde (Schizaphis graminum) Gorgojo del trigo (Listronotus bonariensis) Salta Perico (Conoderus spp.) Gorgojos (Pantomorus spp.)		

RESTRICCIONES DE USO: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite. La venta de semilla tratada, para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley 18.073 que prohibe la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados a consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (funguicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores. Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros terápicos para tratamiento de semillas, excepto aquellos de reacción alcalina. FITOTOXICIDAD: No fitotóxico a las dosis recomendadas. LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO. Fitoquímica S.A es responsable por las características físico-químicas S.A es responsable por las características físico-químicas S.A es responsable por las características físico-químicas de este producto, dado que la utilización y almacena je del mismo están fuera de control de la empresa, en condiciones y medios variables, Fitoquímica S.A declina toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pueda derivar del uso o almacenamiento distinto al indicado en este marbete.



















